Pengaruh Inokulasi *Azotobacter* Penghasil Eksopolisakarida terhadap Berat Kering dan Kandungan Kadmium Kubis (*Brassica oleracea*) di Tanah yang Dikontaminasi Kadmium

Reginawanti Hindersah dan Dedeh H. Arief

Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Jatinangor Km. 21 Bandung 40191

Korespondensi: reginawanti@yahoo.com

ABSTRACT

Effect of Exopolysachharides-producing *Azotobacter* on Dry weight and Cadmium Content of Cabbage (*Brassica oleracea*) Grown in Cd-contaminated Soil

Cadmium (Cd) could enter agricultural land from inorganic fertilizer especially phosphate fertilizers. Accumulator plant such as plants belong to Brassicaceae could accumulate Cd without any toxicity symptoms. Cadmium uptake could be increased with *Azotobacter* inoculation since this rhizobacteria produce exopolysachharides that mobilize heavy metal. This green house experiment has been done to evaluate Cd content enhancement in shoot of cabbage grown in Cd-contaminated soil following *Azotobacter* inoculation. Experimental design was factorial randomized block design with CdCl₂ application on Andisol as first factor and *Azotobacter* isolates as the second one. The results showed that *Azotobacter* sp. LKM6 increased shoot Cd of cabbage grown in Cd-contaminated soil. In this experiment, cabbage grown in Cd-contaminated soil did not show any toxicity symptoms.

Key words: *Azotobacter*, Cabbage, Cadmium.

ABSTRAK

Di lahan pertanian, kadmium (Cd) dapat berasal dari pupuk anorganik terutama pupuk fosfat. Kadmium dapat diakumulasi dalam jumlah berlebih di tanaman akumulator seperti keluarga Brassicaceae tanpa gejala keracunan. Serapan Cd dapat meningkat jika disertai inokulasi pupuk hayati *Azotobacter* yang menghasilkan Eksopolisakarida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan kandungan Cd di tajuk tanaman kubis yang ditanam di tanah dikontaminasi Cd melebihi ambang batas setelah inokulasi bakteri *Azotobacter*. Percobaan rumah kaca dirancang dalam rancangan acak kelompok pola faktorial dengan aplikasi CdCl₂ ke tanah Andisols sebagai faktor pertama dan inokulasi isolat *Azotobacter* sebagai faktor kedua. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa inokulasi *Azotobacter* isolat LKM6 meningkatkan kandungan Cd tajuk kubis yang ditanam di tanah yang dikontaminasi Cd melebihi ambang batas. Pada penelitian ini tanaman kubis yang ditanam di tanah dikontaminasi CdCl₂ tidak memperlihatkan gejala keracunan.

Kata kunci: *Azotobacter*, Kubis, Kadmium.

PENDAHULUAN

Kadmium adalah logam berat non esensial yang perlu diperhatikan karena Cd – bersama dengan Ni dan Zn- adalah logam berat yang paling akhir diadsorpsi tanah dibandingkan dengan Cr, Pb dan Cu (Gomes *et al.* 2001) sehingga Cd relatif lebih tersedia

untuk tanaman. Kandungan Cd tanah di atas ambang batas dapat diakumulasi dalam jumlah berlebih di tanaman, terutama tanaman akumulator. Brassicaceae adalah tanaman sayuran yang banyak mengakumulasi kadmium (Alloway, 1995b) padahal sayuran ini banyak dikonsumsi masyarakat.

Di tanah pertanian tanaman sayuran, peningkatan konsentrasi Cd di tanah pertanian dapat disebabkan oleh pupuk terutama pupuk fosfat dan pupuk kandang (Alloway, 1995b; Chien *et al.* 2003). Batuan fosfat adalah batuan sedimen yang mengandung Cd dengan konsentrasi <10–980 mg kg⁻¹ (Mengel & Kirkby, 1987; Alloway, 1995b) sehingga kandungan Cd di dalam pupuk fosfat akan bervariasi. Roechan *et al.* (1995) melaporkan bahwa kandungan Cd pupuk fosfat berkisar 30–60 mg kg⁻¹. Konsentrasi Cd di tanah yang diberi pupuk NPK dalam jangka waktu panjang dapat meningkat sampai 25,6 % (Palaniappan *et al.* 2002). Aplikasi pupuk fosfat bersamaan dengan pupuk KCl juga dapat meningkatkan konsentrasi Cd tanaman karena terbentuk CdCl₂ yang mobil di larutan tanah (Chien *et al.* 2003). Umumnya tanah mengandung Cd sebesar 0,1–1 mg kg⁻¹ dan dinyatakan terkontaminasi Cd jika konsentrasinya menjadi 3–10 mg kg⁻¹ (Mengel & Kirkby, 1987).

Penggunaan pupuk hayati juga berpotensi meningkatkan serapan Cd oleh akar tanaman melalui berbagai mekanisme. Rizobakteri dapat meningkatkan serapan Cd akar melalui peningkatan pertumbuhan perakaran baik yang disebabkan oleh produksi fitohormon maupun fiksasi nitrogen. Mekanisme lainnya adalah kompleksasi Cd oleh eksopolisakarida (EPS) yang mobil (Chen *et al.* 1995). *Azotobacter* adalah salah satu mikroba yang hidup di rizosfer tanaman dan banyak digunakan sebagai pupuk hayati. Bakteri *Azotobacter* penghasil EPS telah diisolasi dari rizosfer tanaman sayuran termasuk kubis merah, dari lumpur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dari tanah hutan sekunder (Hindersah *et al.* 2006).

Intensitas penggunaan pupuk organik dan pupuk fosfat di tanah Andisol di Lembang Bandung termasuk tinggi karena produksi tanaman sayuran selalu mensyaratkan pemberian bahan organik. Pupuk P sering diberikan karena mineral amorf alofan di Andisols memfiksasi P menjadi tidak tersedia. Sebagian kecil petani sayuran Lembang sudah mengurangi dosis pupuk P dan menggantikannya dengan pupuk organik cair. Umumnya pupuk organik mengandung rizobakteri *Azotobacter* baik yang sengaja ditambahkan maupun berasal dari bahan dasar pupuk.

Isu lingkungan dan keamanan pangan akan terus menurunkan dosis pupuk anorganik dan menggantikannya dengan pupuk organik maupun pupuk hayati. Mengingat potensi akumulasi logam berat oleh pupuk hayati *Azotobacter*, maka

penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan kandungan Cd di tajuk tanaman kubis yang ditanam di tanah dikontaminasi Cd melebihi ambang batas setelah inokulasi *Azotobacter*.

BAHAN DAN METODE

Azotobacter

Isolat *Azotobacter* BS3, LKM6 dan LH15 masing-masing disolasi dari lumpur IPAL PDAM (Cd 4,73 mg kg⁻¹), rizosfer kubis merah yang dibudidayakan di Andisol Lembang (Cd 0,48 mg kg⁻¹) dan tanah Andisols di hutan sekunder Lembang (Cd 0,12 mg kg⁻¹). Bakteri diisolasi dengan media Ashby bebas N menurut Subba Rao (1982). Induksi produksi EPS ketiga bakteri dilakukan pada media Vermani dengan nitrogen (Vermani *et al.*, 1997). Isolat BS3, LKM6 dan LH15 masing-masing memproduksi EPS sebesar 1,6 g L⁻¹, 3,57 g L⁻¹ dan 1,73 g L⁻¹ (Hindersah *et al.* 2006). Ketiga isolat *Azotobacter* adalah koleksi Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

Inokulan cair dipersiapkan dari biakan murni berumur 72 jam di media Vermani dengan nitrogen. Kepadatan sel di dalam inokulan pada saat aplikasi adalah sekitar 10⁸ CFU mL⁻¹.

Percobaan Pot

Percobaan dirancang dalam Rancangan Acak Kelompok pola faktorial dengan tiga ulangan. Perlakuan pertama adalah isolat *Azotobacter* penghasil EPS yaitu isolat BS3, LKM6, dan LH15, sedangkan perlakuan ke dua adalah pemberian CdCl₂ yaitu dengan dan tanpa CdCl₂. Perlakuan kontrol tidak mendapatkan inokulan.

Lima ratus gram tanah Andisol steril (Cd 1,21 mg kg⁻¹) ditempatkan di dalam pot plastik. Untuk tanah yang diberi Cd, 8 mg CdCl₂ yang dilarutkan dalam 10 mL air diaduk merata dengan tanah dan diinkubasi selama 3 hari. Setelah inkubasi, konsentrasi Cd di tanah yang terukur dengan ekstraksi asam nitrat dan asam klorida adalah 9,01 mg kg⁻¹. Tanah di dalam pot yang tidak mendapatkan Cd diberi akuades steril dengan volume yang sama. Bibit tanaman kubis umur 20 hari ditanam di dalam pot plastik dan diinokulasi dengan 5 mL inokulan cair *Azotobacter* dengan isolat sesuai perlakuan. Kadar air tanaman dipertahankan pada kapasitas lapang dan tanaman dipelihara di rumah kaca dengan selama 3 minggu.

Di akhir penelitian diukur populasi *Azotobacter* penghasil EPS di rizosfer kubis dengan

metode pengenceran plat (Schinner *et al.*, 1995) pada media Vermani. Selain itu diukur pula berat kering tajuk setelah pemanasan 70 °C sampai berat konstan serta kandungan Cd tajuk dengan AAS setelah destruksi dengan asam (Sulaeman *et al.* 2005). Seluruh data dianalisis dengan analisis ragam (Uji F 5 %) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi *Azotobacter*

Pada penelitian ini dilakukan sterilisasi tanah sebelum penanaman kubis sehingga *Azotobacter* yang terukur di akhir penelitian sebagian besar berasal dari inokulan. Di akhir penelitian, kisaran populasi *Azotobacter* di setiap perlakuan adalah relatif sama yaitu sekitar 10^4 CFU g⁻¹ (Tabel 1). Data ini memperlihatkan bahwa *Azotobacter* tetap hidup di tanah yang dikontaminasi CdCl₂. Peningkatan populasi yang nyata hanya terdapat di tanah tanpa CdCl₂ yang diberi isolat LKM6. Namun populasi *Azotobacter* LKM 6 menurun nyata pada tanah dengan CdCl₂ dibandingkan tanah tanpa CdCl₂. Data ini menunjukkan bahwa di dalam tanah terdapat kemungkinan penurunan populasi *Azotobacter* jika tanah terpapar kontaminan Cd.

Tabel 1. Interaksi antara aplikasi CdCl₂ dan isolat *Azotobacter* terhadap populasi *Azotobacter* di rizosfer kubis

Isolat <i>Azotobacter</i>	Aplikasi CdCl ₂	
	Tanpa CdCl ₂	Dengan CdCl ₂
	----- × 10 ⁴ CFU g ⁻¹ -----	
Kontrol	2,2 a	2,1 a
	A	A
BS3	3,2 a	3,5 a
	A	A
LKM6	9,7 b	5,2 a
	A	B
LH15	5,5 a	4,2 a
	A	A

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf kecil yang sama (kolom) atau oleh besar yang sama (baris) adalah tidak berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Penghambatan Cd terhadap daya hidup pemfiksasi N nonsimbiotik maupun aktivitas nitrogenase telah diteliti. Athar & Ahmad (2002) menyimpulkan bahwa Cd adalah logam berat paling toksik untuk *A. Chroococcum*, dengan efek penghambatan maksimal di tanah mencapai 84,9 %.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa ketiga isolat relatif resisten terhadap Cd di dalam kultur cair sebesar 0,01–0,1 mM tetapi dihambat oleh 1 Mm CdCl₂ (Hindersah *et al.* 2009). Penghambatan tersebut berlaku hanya terjadi pada isolat LKM6, isolat lainnya sesuai dengan penelitian *in vitro* tidak terjadi pada isolat BS3 dan LH15.

Berat Kering dan Kadmium Tajuk

Secara umum, aplikasi CdCl₂ tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga berat kering tajuk tanaman yang ditanam di tanah tanpa Cd tidak terlalu berbeda dengan yang ditanam di tanah dikontaminasi Cd (Tabel 2). Namun, inokulasi *Azotobacter* isolat LH15 dengan nyata meningkatkan berat kering tajuk kubis umur 3 minggu. Aplikasi isolat ini meningkatkan berat kering tajuk sampai 30 %. Kadmium adalah logam berat non esensial yang dianggap toksik. Data di atas memperlihatkan bahwa keberadaan Cd berlebih di tanah tidak menyebabkan efek toksik untuk tanaman akumulator Cd, kubis.

Tabel 2. Interaksi antara aplikasi CdCl₂ dan isolat *Azotobacter* terhadap berat kering tajuk kubis

Isolat <i>Azotobacter</i>	Aplikasi CdCl ₂	
	Tanpa CdCl ₂	Dengan CdCl ₂
	----- g -----	
Kontrol	0,28 a	0,30 a
	A	A
BS3	0,30 a	0,32 a
	A	A
LKM6	0,30 a	0,32 a
	A	A
LH15	0,36 a	0,40 b
	A	A

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf kecil yang sama (kolom) atau oleh besar yang sama (baris) adalah tidak berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Azotobacter adalah suatu *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* yang berkerja melalui mekanisme fiksasi nitrogen dan produksi fitohormon (Lakshminarayana *et al.* 1992; Abbass & Okon, 1993). Hasil percobaan ini sejalan dengan penelitian Hindersah dan Simarmata (2004) yang menjelaskan bahwa *Azotobacter* berperan meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman tomat dengan media tanam tanah Andisols. Isolat LH15 maupun LKM6 diisolasi dari tanah Andisol tetapi hanya isolat LH15 yang pada percobaan ini berperan sebagai PGPR

yang efektif. Diduga produksi fitohormon isolat ini relatif banyak sehingga mampu meningkatkan perakaran dan selanjutnya tajuk tanaman.

Data pada Tabel 3. membuktikan bahwa aplikasi CdCl₂ meningkatkan kandungan Cd di tajuk selada baik yang ditanam tanpa maupun dengan aplikasi *Azotobacter*. Namun, hanya inokulasi isolat LKM6 yang meningkatkan kandungan Cd tajuk selada yang ditanam di tanah dikontaminasi CdCl₂. *Azotobacter* adalah salah satu bakteri tanah yang menghasilkan EPS yang dapat mengadsorpsi logam berat Cr dan Zn (Emtiazi *et al.* 2004). Peningkatan kandungan Cd di tajuk disebabkan oleh peningkatan ketersediaan Cd yang difasilitasi EPS yang mobil. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Chen *et al.* (1995) bahwa bakteri penghasil EPS dapat memobilisasi logam berat (LB) melalui mekanisme pembentukan kompleks LB-EPS yang mobil.

Tabel 3. Interaksi antara aplikasi CdCl₂ dan isolat *Azotobacter* terhadap Kandungan Cd di tajuk kubis

Isolat <i>Azotobacter</i>	Aplikasi CdCl ₂	
	Tanpa CdCl ₂	Dengan CdCl ₂
	----- mg kg ⁻¹ -----	
Kontrol	0,29 a	1,8 a
	A	B
BS3	0,31 a	1,2 a
	A	B
LKM6	0,28 a	2,8 b
	A	B
LH15	0,29 a	1,5 a
	A	B

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf kecil yang sama (kolom) atau oleh besar yang sama (baris) adalah tidak berbeda nyata menurut uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5 %.

Kandungan Cd tajuk kubis (Tabel 3) yang ditanam di tanah dengan CdCl₂ disertai inokulasi *Azotobacter* isolat LKM6 mencapai 2,8 mg kg⁻¹ tetapi tanaman tidak memperlihatkan gejala keracunan. Fakta ini menunjukkan bahwa Cd dapat terakumulasi di jaringan tanaman tanpa memperlihatkan gejala keracunan seperti klorosis, tanaman layu dan kerdil (Alloway, 1995b).

Tanaman mengembangkan mekanisme proteksi terhadap keracunan Cd melalui sintesis peptida fitokelatin (PC). Peptida ini mengikat Cd dan menyimpannya di dalam vakuola dan plastid (Rauser, 1995; Eapen & D'Souza, 2005) sehingga tidak memasuki sistem fisiologi tanaman. Kemampuan PC untuk mengkompartemen Cd dapat

memproteksi tanaman dari pengaruh racun Cd (Eapen & D'Souza, 2005). Dengan demikian, bahaya peningkatan Cd di tanah pertanian adalah jika Cd terakumulasi di tanaman akumulator seperti kubis yang dikonsumsi manusia.

SIMPULAN

Inokulasi *Azotobacter* isolat LKM6 meningkatkan kandungan Cd tajuk kubis yang ditanam di tanah dengan Cd melebihi ambang batas. Namun, setelah inokulasi *Azotobacter* tidak ada peningkatan kandungan Cd tajuk selada yang ditanam di tanah dengan konsentrasi Cd alami. Pada penelitian ini tanaman kubis tidak memperlihatkan gejala keracunan meskipun kandungan Cd di tajuk lebih dari 2 mg kg⁻¹.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk fasilitas rumah kaca selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbass, Z., Y. Okon. 1993. Plant growth promotion by *Azotobacter paspali* in the rhizosphere. Soil Biol. Biochem. 8: 1075–1083.
- Alloway, B.J. 1995a. The Origin of heavy metals in soils. In Alloway, B.J (Ed). Heavy Metals in Soils. Blackie Academic & Professional. Glasgow.
- Alloway, B.J. 1995b. Cadmium. In Alloway, B.J (Ed). Heavy Metals in Soils. Blackie Academic & Professional. Glasgow.
- Athar, R and M Ahmad. 2002. Heavy metal toxicity on plant growth and metal uptake by wheat and on free living *Azotobacter*. Water, Air, and Pollution. 138: 165–180.
- Chen, J-H, DR Czajka, LW Lion, ML. Shuler and WC Ghiorse. 1995. Trace metal mobilization in soil by bacterial polymers. Environ. Health Perspect 103: 53–58.
- Eapen, S and SF D'Souza. 2005. Prospects of genetic engineering of plants for phytoremediation of toxic metals. Biotech. Adv. 23: 97–114.
- Chien, SH, G Carmona, LL Prochnow and ER Austin. 2003. Cadmium availability from granulated and bulk-blended phosphate-potassium fertilizers. J. Environ. Qual. 32:1911-1914.

- Emtiazi, G, Z Ethemadifar and MH Habibi. 2004. Production of extracellular polymer in *Azotobacter* and biosorption of metal by exopolymer. *Afr. J. Biotech.* 3: 330–333.
- Gomes, PC, MPF Fontes, AG da Silva, E de S Mendonca, and AR Netto. 2001. Selectivity sequences and competitive adsorption of heavy metals by Brazilian soil. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 65:1115–1121.
- Hindersah, R dan T Simarmata. 2004. Kontribusi rizobakteri *Azotobacter* dalam meningkatkan kesehatan tanah melalui fiksasi N₂ dan produksi fitohormon di rizosfir. *Jurnal Natur Indonesia* 6: 127–133.
- Hindersah, R, DH Arief, S Soemitro and L Gunarto. 2006. Exopolysaccharide extraction from rhizobacteria *Azotobacter* sp. *Proc. International Seminar IMTGT.* Medan, 22–23 Juni 2006. Pp 50–55.
- Hindersah, R, DH Arief, S Soemitro dan L Gunarto. 2009. Pengaruh CdCl₂ terhadap produksi eksopolisakarida dan daya hidup *Azotobacter*. *Jurnal Natur Indonesia*, 12: 34–37.
- Lakshminarayana, K, H Narula, IS Hooda nad AS Faroda. 1992. Nitrogen economy in wheat (*Triticum aestivum*) through use of *Azotobacter chroococcum*. *Indian Journal of Agric. Sci.* 62: 75–76.
- Mengel, K., and E.A. Kirkby. 1987. *Principles of Plant Nutrition.* International Potash Institute. Bern.
- Palaniappan, M., K. Shanmugam, and S., Ponnusam. 2002. Soil degradation due to heavy metal accumulation under long term fertilization. Paper 333. *Proceeding of 17th World Congress of Soil Science*, Bangkok, Thailand, 14–20 August 2002. <http://citeseer.ist.psu.edu/656685.html> [23/09/04]
- Roechan, S., I. Nasution, L. Sukarno, A.K. Makarim. 1995. Masalah pencemaran kadmium pada padi sawah. Hal 33–37 dalam *Kinerja Penelitian Tanaman Pangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.* Syam, M, A Hermanto, Mussadad dan Sunihardi (Ed). Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Rausser. W.A. 1995. Phytochelatin and related peptides. *Structure, biosynthesis and function.* *Plant Physiol.* 109: 1141–1149.
- Schinner, F., R. Ohlinger, E. Kandeler, and R. Margesin. 1995. *Methods in Soil Biology.* Springer-Verlag. Berlin.
- Sulaeman, Suparto, dan Eviati. 2005. *Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk.* Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanah. Bogor.
- Vermani, M.V., S.M. Kelkar, and M.Y. Kamat. 1997. Studies in polysaccharide production and growth of *Azotobacter vinelandii* MTCC 2459, a plant rhizosphere isolate. *Lett. Appl. Microbiol.* 24: 379–383.