KARAKTERISTIK FISIKO-KIMIA DAN SENSORIK JUS EKSTRAK BUAH SALAK (*Salacca edulis* Reinw) VARIETAS BONGKOK

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTIC AND SENSORY OF SNAKE FRUIT ETRACT JUICE (*Salacca edulis* Reinw) VARIETIES BONGKOK

Leni Herliani Afrianti*, Yusman Taufik & Hafni Gustianova

*Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan
Jl. Dr. Setiabudi No 93, Bandung, 40153, Indonesia
Alamat korespondensi: leni_priyatno@yahoo.com

Abstrak: Salak merupakan salah satu tanaman buah tropis asli Indonesia. Salak varietas Bongkok berasal dari Kabupaten, Sumedang, Jawa Barat. Salak Bongkok mempunyai rasa yang asam, pahit dan sepet, oleh karena itu permintaan terhadap salak Bongkok ini rendah karena kurang diminati oleh konsumen. Buah salak Bongkok mengandung senyawa fenolik, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid dan quinon. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui karakteristik fisiko-kimia dan sensorik jus dari ekstrak buah salak (*Salacca edulis* Reinw.) varietas Bongkok. Metode penelitian menggunakan dua tahapan perlakuan. Untuk tahapan perlakuan pertama, membuat serbuk (simplisia) dari buah salak, ekstraksi simplisia dengan etanol 70%, terakhir membuat jus buah dengan rasio antara ekstrak dan air, masing-masing (1:2); (1:3); (1:4); (1:5); (1:6); (1:7); (1:8); dan (1:9). Tahap perlakuan kedua adalah uji vitamin C, kadar alkohol, viskositas, dan uji sensorik dari jus buah salak. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan dan ulangan sebanyak tiga kali untuk setiap kombinasi perlakuan sehingga diperoleh dua puluh empat percobaan. Rancangan analisis dibuat analisis variasi, selanjutnya untuk uji beda nyata menggunakan metode Duncan. Jus ekstrak buah salak Bongkok yang terpilih adalah jus dengan rasio antara ekstrak etanol dari buah dan air (1:4), dengan kadar Vitamin C adalah 3,38 mg/100 g; kadar alkohol 0,87%; viskositas 0,0139 Cp; warna 3,57; aroma 4,0 dan rasa 4,22.

Kata kunci: Jus buah Salak var. Bongkok, Vitamin C, Viskositas, Kandungan alkohol, Uji sensorik

Abstract: Salak is one of the original tropical fruit plants from Indonesia. Salak Bongkok varieties, coming from Sumedang Regency West Java. Salak Bongkok has a sour, bitter taste and tart, therefore the demand for this low because the salak Bongkok are less sought after by consumers. Salak Bongkok fruit contain of phenolic compounds, alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, terpenoids, and quinon. The aim of this study is to determine the physico-chemical characteristics and sensory of fruit juice extract of snake fruits (*Salacca edulis* Reinw.) varieties Bongkok. The method involved two treatment stages of research. The first treatment stage was to make powder (simplisia) of the fruits, to extract the simplisia with 70% ethanol, and then to make fruit juice with the ratio between the extract and water, (1:2); (1:3); (1:4); (1:5); (1:6); (1:7); (1:8); and (1:9), respectively. The second treatment stage was analyzed of vitamin C and alcohol content, then analyzed of viscosity and sensory of the fruit juice. The experimental design using a randomized block design with 8 treatments and repeat each combination of treatment three times in order to obtain twenty four trials. The analysis model was made of variation analysis, subsequently to test significant difference using Duncan method. Snake fruit juice chosen was juice with the ratio between the ethanol extract of the fruit and water (1:4), with vitamin C level of 3.38 mg/100g; alcohol content of 0.87%; the viscosity of 0.0139 Cp; color was 3.57; smell was 4.0 and the taste was 4.22.

Keywords: juice of snake fruit of var. Bongkok, vitamin C, viscosity, alcohol content, sensory test

PENDAHULUAN

Salak merupakan salah satu tanaman buah tropis asli Indonesia. Salak varietas Bongkok berasal dari Kabupaten, Sumedang, Jawa Barat. Salak Bongkok mempunyai rasa yang asam, pahit dan sepet, oleh karena itu permintaan terhadap salak Bongkok ini rendah karena kurang diminati oleh konsumen. Buah salak Bongkok mengandung senyawa fenolik, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid dan

quinon (Afrianti *et al.*, 2007; Afrianti *et al.*, 2010). Menurut Leong dan Shui (2002), rata-rata buah salak mengandung vitamin C $2,4 \pm 1,5$ mg/100gram. Sedangkan Vitamin C pada buah salak Bongkok adalah 8,37 mg/100 g berat bahan (Afrianti *et al.*, 2006). Selain itu ekstrak etanol buah salak Bongkok mengandung antioksidan $2,45 \pm 1,6$ µg/mL (Afrianti *et al.*, 2007) menjadikan buah salak layak untuk dibuat produk minuman yang menyehatkan.

Salah satu diversifikasi produk minuman buah adalah membuat jus atau minuman sari buah. Jus buah dapat dibuat dari satu atau campuran berbagai jenis buah. Karena itu untuk meningkatkan nilai ekonomis buah salak Bongkok yang mempunyai potensi kesehatan bagi manusia maka perlu dilakukan diversifikasi buah dengan membuat jus buah dengan berbagai variasi rasio antara ekstrak dan air.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. No.HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan mengatur definisi dan karakteristik dasar sari buah, terkait ketentuan bahan baku, proses pengolahan dan produk jadi. Definisi sari buah adalah cairan yang diperoleh dari bagian buah yang dapat dimakan yang dicuci, dihancurkan, dijernihkan (jika dibutuhkan), dengan atau tanpa pasteurisasi dan dikemas untuk dapat dikonsumsi langsung. Sari buah dapat berisi hancuran buah, keruh, atau jernih. Pada sari buah hanya dapat ditambahkan konsentrat jika berasal dari jenis buah yang sama.

Anggraini (2010) membagi jus buah menjadi dua, yaitu sari buah yang dihasilkan langsung dari proses pengempaan, penghancuran dan penggilingan buah dan sari buah yang dihasilkan dari konsentrat dengan merekonstitusi konsentrat sari buah dengan air minum. Proses pembuatan sari buah harus dapat mempertahankan sifat fisik, kimia, dan organoleptik dan karakter zat gizi dari sari buah aslinya

Jumlah air yang ditambahkan pada jus buah tergantung pada jenis buah yang digunakan dan kepekatan sari buah yang diinginkan. Umumnya pengenceran yang digunakan untuk jus buah adalah sebanyak tiga sampai dengan empat kali volume sari buah, sedangkan pada jus lidah buaya adalah 1:2 (Fachruddin, 2011). Menurut Herawati dkk (2011) perbandingan konsentrat jus buah labu jering dengan air yang paling disukai adalah 1:4.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama, pembuatan serbuk simplisia dilanjutkan dengan ekstraksi simplisia dengan etanol 70%. Tahap kedua dilakukan pengujian vitamin C (AOAC, 2006), kadar alkohol, viskositas dan uji sensorik jus buah salak Bongkok dari ekstrak etanol 70% dari buah.

Pembuatan Simplisia (serbuk)

Buah salak dilakukan blansing dengan suhu (60-70°C, 5-7 menit), pengupasan kulit, pemotongan dan pengeringan dengan *tunnel dryer* selama 24 jam x 3 hari pada suhu $\pm$ 40-50°C.

Ekstraksi

Simplisia buah diekstraksi secara maserasi-perkolasi pada suhu kamar dengan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam. Selanjutnya ekstrak etanol dievaporasi sampai kental.

Jus Buah Ekstrak Etanol

Membuat jus buah dari ekstrak etanol dengan perbandingan ekstrak dengan air matang masing-masing adalah (1:2), (1:3), (1:4), (1:5), (1:6), (1:7), (1:8), dan (1:9). Selanjutnya jus buah dipasteurisasi pada suhu 60-70°C selama 15 menit. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan delapan perlakuan dan ulangan sebanyak tiga kali untuk setiap kombinasi perlakuan sehingga diperoleh dua puluh empat percobaan. Rancangan analisis dibuat analisis variasi (ANOVA), selanjutnya untuk uji beda nyata menggunakan metode Duncan.

Pengujian Vitamin C (AOAC, 1990)

Sebanyak 50 mL jus buah dimasukkan ke dalam labu ukur, ditambah 25 mL asam metafosfat 20% kemudian diencerkan dengan air suling sampai batas tera dan dikocok hingga homogen. Sebanyak 10 mL larutan diambil dan ditambahkan dengan 2,5 mL aseton dan dititrasi dengan 2,6-diklorofenol indofenol. Titrasi dihentikan sampai terlihat warna merah jambu.

Perhitungan :

$$\text{Konsentrasi sampel} = \frac{V_2 - V_0}{V_1 - V_0} \times C_1$$

Keterangan:

V_1 = volume larutan 2,6-diklorofenol indofenol yang digunakan untuk titrasi standar vitamin C

V_2 = volume larutan 2,6-diklorofenol indofenol yang digunakan untuk titrasi larutan sampel

V_0 = volume larutan 2,6-diklorofenol indofenol yang digunakan untuk titrasi larutan blanko

C_1 = Konsentrasi larutan standar vitamin C

Kadar vitamin C sebagai mg/100 g sampel

Uji Alkohol (SNI, 1995)

Sari buah dipipet 50 mL dan dimasukkan ke dalam labu destilat. Sebanyak 50 mL aquadest dan batu didih ditambahkan dan kemudian didestilasi. Hasil destilasi $\pm$ sebelum tanda batas dalam labu ukur 50 mL. Destilasi dihentikan pada saat cairan destilat kurang lebih 1 cm dari garis batas destilat dan ditepatkan dengan aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan, lalu ditutup rapat. Berat jenis alkoholnya dihitung dan dikonversikan ke tabel untuk menghitung kadar alkoholnya.

Uji Viskositas (AOAC, 1990)

Pengujian viskositas diawali dengan pengujian berat jenis sari buah dengan menggunakan piknometer. Piknometer kosong ditimbang (m) kemudian aquades 10 mL dimasukkan ke dalam piknometer, sampel dimasukkan ke dalam piknometer 10 mL ditimbang (m'). Aquades 10 mL dimasukkan ke dalam pipa Ostwald dan dihisap sampai tanda merah tera bagian atas. Waktu turun aquades sampai tanda tera dihitung (t air). Sampel 10 mL dimasukkan ke dalam pipa Ostwald dan dihisap sampai tera bagian atas. Waktu turun sampel sampai

tanda tera dihitung (t sampel). Kekentalan viskositas dihitung :

$$\text{Viskositas} = \frac{\rho_{\text{sampel}} \times t_{\text{sampel}} \times \eta_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}$$

$$\rho_{\text{sampel}} = \frac{m' - m}{v}$$

Keterangan:

m	: massa piknometer kosong (g)
m'	: massa piknometer kosong + sampel (g)
v	: volume piknometer (mL)
η	: viskositas air (1,0 Cp)
P	: berat jenis sampel (g/ml)
t sampel	: waktu alir sampel (detik)
t air	: waktu alir air (detik)

Uji Organoleptik

Pengujian dilakukan menggunakan uji hedonik (kesukaan) oleh lima belas orang panelis agak terlatih berusia 18-21 tahun. Panelis dipilih dari mahasiswa Prodi Teknologi Pangan Universitas Pasundan yang sudah mendapatkan mata kuliah praktikum uji inderawi. Penilaian kesukaan dilakukan dengan cara sampel yang telah disediakan dicicipi dan diberikan penilaian terhadap tingkat kesukaan. Skor yang diberikan adalah 1-5, mulai dengan sangat tidak suka (skor 1), tidak suka (skor 2), agak suka (skor 3), suka (skor 4) dan sangat suka (skor 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Vitamin C

Berdasarkan hasil analisis variasi, menunjukkan bahwa rasio ekstrak etanol dengan air berpengaruh nyata terhadap kadar vitamin C jus buah salak Bongkok ($p \geq 0,05$).

Tabel 1. Kadar vitamin C jus buah salak Bongkok.

Perbandingan Ekstrak (Etanol : Air)	Vitamin C (mg/100 g)
1 : 9	0,67 ± 0,01a
1 : 8	1,35 ± 0,012 b
1 : 7	1,50 ± 0,01 b
1 : 6	2,20 ± 0,02 c
1 : 5	2,90 ± 0,013 c
1 : 4	3,38 ± 0,02 d
1 : 3	4,50 ± 0,02 e
1 : 2	4,73 ± 0,011 e

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang ditambahkan (1:2) maka kadar vitamin C semakin tinggi yaitu 4,73 mg/100g, sedangkan vitamin C terendah terdapat pada (1:9) dengan Vitamin C sebesar 0,67±0,01 mg/100 g. Selain mudah rusak, vitamin C juga mudah larut dalam air. Kadar vitamin C buah simplisia salak Bongkok adalah 8,37 mg/100 g (Afrianti *et al.*, 2007), namun setelah menjadi minuman jus buah terjadi penurunan secara

signifikan, hal ini karena terjadi proses pemanasan pada suhu 60-70°C selama 15 menit.

Kadar Alkohol

Berdasarkan hasil analisis variasi, menunjukkan bahwa perbandingan ekstrak dengan air berpengaruh nyata terhadap kadar alkohol jus buah salak Bongkok ($p \geq 0,05$). Rasio ekstrak dengan air terhadap kadar alkohol jus buah ditunjukkan pada Tabel 2.

Rasio ekstrak dengan air (1:2) mempunyai kadar alkohol 1,16%, sedangkan rasio (1:9) adalah 0,31%. Adanya kandungan alkohol pada jus buah salak, karena pelarut yang digunakan saat ekstraksi adalah etanol 70%, dan evaporasi (penguapan) tidak optimal untuk menguapkan etanol, sehingga jus buah masih mengandung alkohol.

Menurut konsep standar perdagangan tahun 1975 dalam Siswadi (1985) bahwa minuman ringan dapat didefinisikan sebagai minuman yang dibuat untuk dapat diminum langsung tanpa diencerkan atau setelah diencerkan, dan dapat berupa minuman ringan yang tidak mengandung etanol dan minuman ringan yang mengandung etanol dengan kadar tidak lebih dari 1,5% yang dapat berupa hasil fermentasi atau campuran minuman ringan dan minuman keras.

Namun menurut SNI 01-3719-1995, minuman sari buah atau jus adalah minuman ringan yang dibuat dari sari buah dan air dengan atau tanpa penambahan gula dan bahan tambahan makanan yang diizinkan, tidak difermentasi dan tidak mengandung alkohol.

Tabel 2. Kadar alkohol jus buah salak.

Perbandingan Ekstrak (Etanol : Air)	Kadar Alkohol (%)
1 : 9	0,29 ± 0,020 a
1 : 8	0,31 ± 0,010a
1 : 7	0,60 ± 0,010 b
1 : 6	0,65 ± 0,013b
1 : 5	0,69 ± 0,022b
1 : 4	0,87 ± 0,012c
1 : 3	0,96 ± 0,010c
1 : 2	1,16 ± 0,010d

Viskositas

Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair.

Berdasarkan hasil analisis variasi, rasio ekstrak salak dan air berpengaruh nyata terhadap viskositasjus buah salak Bongkok ($p \geq 0,05$). Viskositas jus buah salak ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan uji lanjut Duncan terdapat perbedaan yang nyata terhadap viskositas. Viskositas terbesar pada rasio 1:2 yaitu 0,0207 Cp, sedangkan viskositas terkecil adalah 0,0105 Cp dengan rasio 1 : 9.

Viskositas adalah sifat fisika yang dapat dilakukan dalam pengujian bahan pangan salah satunya adalah jus buah salak, dimana semakin besar nilai viskositas jus buah maka menunjukkan semakin kental konsentrasi bahan tersebut. Perubahan ini terjadi karena semakin banyak jumlah air yang ditambahkan terhadap ekstrak maka viskositas produk akan semakin kecil dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit air yang ditambahkan terhadap ekstrak maka viskositasnya pun akan semakin tinggi.

Tabel 3. Viskositas jus buah salak Bongkok.

Perbandingan Ekstrak etanol : Air	Viskositas (Cp)
1 : 9	0,0105± 0,010 a
1 : 8	0,0110± 0,010 b
1 : 7	0,0111± 0,012 c
1 : 6	0,0126± 0,020 d
1 : 5	0,0136± 0,020 e
1 : 4	0,0139± 0,021 e
1 : 3	0,0147± 0,022 f
1 : 2	0,0207± 0,020 g

Menurut Brennan (1974), ketika suatu cairan melalui suatu tabung, lapisan zat cair yang bersentuhan langsung dengan dinding tabung relatif diam, sementara cairan di tengah relatif mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Besarnya gaya gesekan yang terjadi antara zat yang bergerak dengan yang diam inilah dinamakan koefisien viskositas atau sering juga hanya disebut viskositas. Semakin kuat interaksi partikel cairan yang bergerak akan semakin besar viskositasnya, dengan kata lain zat cair itu semakin kental.

Uji Organoleptik

Uji organoleptik pada jus buah salak Bongkok adalah atribut warna, aroma, dan rasa.

Warna

Penentuan mutu bahan pangan sebelum faktor lain dijadikan bahan pertimbangan faktor warna tampil lebih dahulu, kadang-kadang sangat menentukan, suatu bahan pangan yang bernilai gizi, enak dan teksturnya sangat baik, kurang diminati bila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya (Winarno, 1997).

Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap atribut warna jus buah salak Bongkok menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata ($p \geq 0,05$). Warna jus buah salak Bongkok ditunjukkan pada Tabel 4. Warna yang paling disukai oleh panelis yaitu rasio ekstrak dan air (1:9) dengan rata-rata sebesar 4,72. Sedangkan warna yang kurang disukai oleh panelis yaitu rasio ekstrak dengan air (1:2) dengan rata-rata sebesar 2,17.

Sebagian bahan pangan mengalami perubahan warna seperti karamelisasi karena proses, pemanasan menyebabkan produk berwarna kecoklatan, proses pencoklatan terjadi oleh enzim fenolase yang

bereaksi dengan gula. Pencoklatan juga disebabkan kontak langsung dengan udara luar secara oksidatif, atau logam. Inaktivasi enzim fenolase adalah dengan proses *blanching*, buah salak dilakukan pemanasan dengan suhu sekitar 60°C selama kurang dari 10 menit.

Tabel 4. Warna jus buah salak Bongkok.

Perbandingan Ekstrak (Etanol : Air)	Warna
1 : 2	2,17± 0,5 a
1 : 3	2,93± 0,7 b
1 : 4	3,57± 0,25 c
1 : 5	3,70± 0,6 d
1 : 6	3,75± 0,9 d
1 : 7	3,87± 0,56 e
1 : 8	4,30± 0,23 e
1 : 9	4,72± 0,45 f

Penambahan air pada jus buah salak mempengaruhi tingkat kesukaan panelis, ini ditunjukkan pada Tabel 4, perbandingan ekstrak dan air (1:9) mempunyai nilai rata-rata lebih disukai oleh panelis. Panelis lebih menyukai warna kuning dan bening, dibandingkan dengan warna jus buah yang pekat.

Aroma

Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap atribut aroma jus buah salak menunjukkan bahwa perbandingan ekstrak dengan air memberikan pengaruh nyata terhadap aroma jus buah salak Bongkok ($p \geq 0,05$). Pengaruh perlakuan perbandingan ekstrak dan air pada jus buah salak Bongkok ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Aroma jus buah salak Bongkok.

Perbandingan Ekstrak (Etanol : Air)	Aroma
a ₁ (1:2)	3,12± 0,1
a ₂ (1:3)	3,55± 0,1
a ₇ (1:8)	3,70± 0,5
a ₄ (1:5)	3,92± 0,4
a ₃ (1:4)	4,00± 0,2
a ₆ (1:7)	4,05± 0,1
a ₈ (1:9)	4,08± 0,5
a ₅ (1:6)	4,13± 0,3

Aroma yang paling disukai oleh panelis yaitu dengan rasio ekstrak dan salak yaitu 1:6 dengan rata-rata 4,13, sedangkan aroma pada 1:2 mempunyai nilai rata-rata 3,12 masih pada level disukai panelis.

Rasa

Rasa merupakan faktor yang juga cukup penting dari suatu produk minuman. Komponen yang dapat menimbulkan rasa yang diinginkan tergantung dari senyawa penyusunnya. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari satu rasa saja akan tetapi gabungan dari berbagai macam rasa yang terpadu sehingga menimbulkan citarasa yang utuh. Faktor

dan konsistensi suatu bahan pangan mempengaruhi citarasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Perubahan yang terjadi pada citarasa bahan pangan biasanya lebih kompleks daripada yang terjadi pada warna bahan pangan (Winarno, 1997).

Rasa yang ditimbulkan oleh bahan pangan berasal dari sifat bahan itu sendiri atau pada saat proses ditambahkan dengan zat lain sehingga rasa aslinya bisa berkurang ataupun bertambah. Selain itu rasa yang terdapat pada produk makanan dapat berubah dari rasa yang sebenarnya atau yang diharapkan, hal ini tergantung dari senyawa penyusunnya, misalnya gula yang dapat memberikan rasa manis pada beberapa produk makanan (Kartika dkk, 1988).

Berdasarkan hasil uji sensorik atribut rasa jus buah salak Bongkok menunjukkan tingkat kesukaan panelis pada rasio dari ekstrak dan air berpengaruh nyata terhadap rasa jus buah salak ($p \geq 0,05$). Rasa jus buah salak Bongkok ditunjukkan pada Tabel 6.

Atribut rasa yang paling disukai oleh panelis adalah rasio ekstrak dan air (1:4) dan rata-rata yang diperoleh sebesar 4,22, sedangkan rasa yang kurang disukai oleh panelis adalah (1:8) dan rata-rata yang diperoleh sebesar 2,70. Rasio 1:4 merupakan rasio yang tepat untuk atribut rasa karena penambahan tidak terlalu banyak dan juga tidak sedikit sehingga rasa dari jus buah mempunyai keasaman yang cukup. Penambahan air yang terlalu banyak dengan rasio dari 1:5 sampai 1:9 mempunyai rasa tidak disukai karena jus berasa hambar, sedangkan penambahan air yang terlalu sedikit yaitu 1:2 dan 1:3 menjadikan rasa jus sangat asam.

Tabel 6. Rasa jus buah salak Bongkok.

Perbandingan Ekstrak etanol : Air	Rasa
a ₇ (1:8)	2,70± 0,1
a ₈ (1:9)	3,10± 0,1
a ₆ (1:7)	3,32± 0,5
a ₅ (1:6)	3,38± 0,4
a ₁ (1:2)	3,65± 0,2
a ₄ (1:5)	3,95± 0,1
a ₂ (1:3)	4,12± 0,5
a ₃ (1:4)	4,22± 0,3

KESIMPULAN

Jus ekstrak buah salak Bongkok yang terpilih adalah rasio antara ekstrak etanol 70% dari buah dan air (1:4), dengan kadar Vitamin C adalah 3,38 mg/100 g; viskositas 0,0139 Cp; warna 3,57; aroma 4,0 dan rasa 4,22. Jus buah salak Bongkok belum sesuai dengan syarat SNI 01-3719-1995, karena masih mengandung alkohol 0,87%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Hibah Kompetensi DP2M yang telah memberikan dana penelitian tahun anggaran 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, L.H, Slamet, I., Adnyana, I.K., & Elin, Y.S, (2006), Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daging Buah Salak Varietas Bongkok (*Salacca edulis* Reinw), *Acta Pharmaceutica Indonesia*.
- Afrianti, L.H, Slamet, I., Adnyana, I.K. & Elin Y.S. (2007). Xanthine Oxidase inhibitor activity of terpenoid and pyrrole compounds isolated from snake fruit (*Salacca edulis* Reinw) variety of Bongkok. *J. Applied Sciences*, 7(20): 3127-3130.
- Anggraini, I. (2010). *Klasifikasi dan Pelabelan Minuman Buah*. www.foodreview.biz.
- Brennan, J. G. (1974). *Food Engineering Operations*, Applied Science Publisher Limited. London
- Fachrudin, L. (2011). *Membuat Aneka Sari Buah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Herawati. (2011). *Pengolahan Konsentrat Sari Buah Labu Jepang (Kobucha) dengan Menggunakan Evaporator Vakum*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jabar, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor.
- Kartika, B., Hastuti, P., dan Supartono, W. (1988). *Pedoman Uji Inderawi Bahan Pangan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Siswadi, C.L. (1985). *Pembuatan Minuman Sari Tape Dari Ekstraksi Tape Ubi Kayu*, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Standar Nasional Indonesia 01-3719, (1995), *Minuman Sari Buah*, Dewan Standarisasi Nasional.
- Winarno, F. G., (1997), *Kimia Pangan dan Gizi*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.