Hubungan index massa tubuh/umur (IMT/U) dengan *crowding* Anterior pada anak usia 10-12 tahun

Alvina Roesianto^{1*}, Winny Suwindere¹, Linda Sari Sembiring¹

¹Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

*Korespondensi: alvinar135@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Gizi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, namun gizi masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Kekurangan gizi terhadap seseorang memiliki dampak terhadap rongga mulutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan rahang yang terhambat sehingga dapat menyebabkan *crowding*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) dengan terjadinya *crowding* anterior pada anak usia 10-12 tahun pada SD Mulia Wacana Bandung. **Metode:** Jenis penelitian observasional-analitik dengan rancangan penelitian berupa cross-sectional. Subjek penelitian berjumlah 74 anak di SD Mulia Wacana Bandung, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang dikumpulkan berupa status gizi anak berdasarkan Index Massa tubuh / Umur (IMT/U) dan keadaan susunan gigi (*crowding*). Analisis data menggunakan Fisher Exact Test. Pengolahan data menggunakan program SPSS. **Hasil:** Terdapat 8,8% anak kategori obesitas (14%) terdapat *crowding* anterior, 1,8% anak kategori overweight (12,3%) terdapat *crowding* anterior, 21,1% anak kategori normal (36,8%) terdapat *crowding* anterior, dan 24,6% anak kategori kurus (36,8%) terdapat *crowding* anterior dan didapatkan nilai p untuk Fisher Exact Test sebesar 0,108. **Simpulan:** tidak terdapat hubungan status gizi dengan *Crowding* Anterior.

Kata kunci: *Crowding* anterior, gizi, status gizi

Relationship between body mass index/age (BMI/A) and crowding anterior of children aged 10-12 Years in Elementary School "X"

ABSTRACT

Introduction: Nutrition has an important role in the growth and development of the body, but nutrition remains a major public health problem in Indonesia. Lack of nutrition has an impact on the oral cavity of growth and development of the jaw that is inhibited so that it can cause crowding. The purpose of this study to determine the relationship of Body Mass Index for Age (BMI/A) with the occurrence of anterior crowding in children aged 10-12 years on SD Mulia Wacana Bandung. **Method:** This research is an observational-analytic research with cross-sectional design. Subjects were 74 children in SD Mulia Wacana Bandung, and the sample was selected by using purposive sampling technique which is based on inclusion and exclusion criteria. The collected data consisted of nutritional status of children based on Body Mass Index for Age (BMI/A) and the state of the arrangement of teeth (*crowding*). Data analysis using Fisher Exact Test. Data processing using SPSS program. **Results:** there were 8.8% of obese children (14%), anterior crowding, 1.8% overweight children (12.3%), anterior crowding, 21.1% normal category (36.8% there was anterior crowding, and 24.6% children of thin category (36.8%) had anterior crowding and obtained p value for Fisher Exact Test of 0.108. **Conclusions:** show no relationship of nutritional status with Anterior Crowding.

Keywords: Anterior crowding, nutrition, nutritional status

PENDAHULUAN

Gizi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, namun gizi masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia.¹ Status gizi merupakan kondisi kesehatan yang terkait dengan konsumsi makanan oleh tubuh dan suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan.² Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup.³ Menurut WHO⁴ status gizi berdasarkan IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur) dikategorikan menjadi sangat kurus, kurus, obesitas, *overweight*.

Status gizi berdasarkan IMT/U yang rendah (<-2 Standar Deviasi) merupakan pertanda dimana anak mengalami kekurangan gizi. WHO⁴ memperkirakan bahwa anak yang kekurangan gizi sejumlah 181,9 juta (32%) di negara yang sedang berkembang di Asia Selatan bagian tengah dan Afrika Timur. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013)⁶, prevalensi gizi kurang pada balita adalah 19,6%. Prevalensi kurus dan sangat kurus secara nasional tahun 2013 masih cukup tinggi yaitu masing-masing 12,1% dan 5,3%.⁶ Hasil penelitian dari UNICEF⁵ mengatakan terdapat 16 provinsi menunjukkan prevalensi berat badan kurang pada anak sekitar 20%.

Kekurangan gizi terhadap seseorang memiliki dampak terhadap rongga mulutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan rahang yang terhambat sehingga dapat menyebabkan *crowding*.⁶ Kurang gizi menyebabkan berkurangnya tinggi dari rahang, panjang dari dasar tengkorak dan variasi lebar maxillomandibular yang dapat mengakibatkan maloklusi terutama *crowding* karena kurangnya ruangan untuk gigi tumbuh ditempat yang tepat. Namun *crowding* juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk, genetik, dan gangguan pertumbuhan skeletal.⁷

Al-Balkhi dan Al-Zahrani⁸ meneliti dari 614 pasien Saudi Arabia ditemukan *crowding* sebesar 49,5% terutama pada regio anterior. Menurut penelitian Nur Avia⁹ pada tahun 2017 di Banjarbaru menunjukkan prevalensi *crowding* anterior sebesar 61%. Kemudian penelitian Thomas¹⁰ menyatakan terdapat dampak malnutrisi pada kesehatan *oral*, dihubungkan dengan tingginya prevalensi karies,

dimana sama tingginya dengan kejadian malformasi *dental* dan trauma pada jaringan lunak. Kemudian ditemukannya efek secara signifikan dari malnutrisi pada pertumbuhan dan perkembangan dari tulang fasial pada anak dan perkembangan dari otot skeletal. Penelitian Staufer¹¹ menyatakan bahwa terjadinya *crowding* dapat menyebabkan infraksi pada gigi, fraktur pada gigi, gangguan mastikasi, karies, gingivitis, periodontitis dan resesi gingiva.¹¹

Resorpsi gigi sulung dan erupsi gigi permanen dimulai pada periode sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun yang biasanya disebut sebagai periode *mixed dentition*. Periode sekolah dibagi menjadi 2 bagian yaitu periode sekolah awal dari usia 6-10 tahun dan periode prepubertal dari usia 10 hingga 12 tahun yang merupakan akhir dari periode *mixed dentition*. Dimana proses pertumbuhan akan berlangsung sampai umur 12 tahun dan gigi anterior permanen telah erupsi seluruhnya sehingga dapat mengamati *crowding* secara keseluruhan pada gigi permanen anterior.¹²

Hasil penelitian Brito et al.¹³ menyatakan lebih tingginya prevalensi *crowding* pada periode *mixed dentition* (26,8%) daripada periode gigi permanen (18,7%). Pemeriksaan dini terhadap maloklusi perlu dilakukan pada masa prepubertal sehingga bila ditemui adanya maloklusi dapat dilakukan perawatan dini.¹⁴ Anak pada periode usia *mixed dentition* juga sering mengalami kurangnya gizi karena mengingat bertambahnya berat badan dan aktivitasnya sehingga membutuhkan gizi dengan porsi lebih banyak. Tetapi adakalanya mereka lebih suka makan di kantin, terpengaruh oleh lingkungannya sehingga mengakibatkan gizinya kurang.^{15,16}

Status gizi yang kurang dapat juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi yang buruk. Sekolah Dasar Mulia Wacana merupakan sekolah swasta yang rata-rata siswanya berada pada tingkatan sosial ekonomi menengah ke bawah sehingga mengakibatkan daya beli yang kurang yang dapat mempengaruhi asupan makanan pada anak, hal ini telah dilakukan observasi sebelumnya dimana iuran uang sekolah setiap anak ditentukan sesuai kemampuan ekonomi orang tuanya dan tidak ditentukan oleh sekolah tersebut.

Uraian tersebut diatas mendorong untuk meneliti dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) dengan *crowding* anterior pada anak. Peneliti akan melakukan penelitian pada anak usia

10 hingga 12 tahun. Penelitian ini dilakukan pada SD Mulia Wacana dengan tingkat sosial ekonomi yang menengah kebawah.

METODE

Jenis penelitian observasional-analitik dengan rancangan penelitian berupa cross-sectional. Subjek penelitian berjumlah 74 anak di SD Mulia Wacana Bandung. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang artinya sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu oleh peneliti yaitu kriteria inklusi dan eksklusi.¹⁷ Kriteria inklusi adalah anak usia 10-12 tahun yang bersekolah di SD Mulia Wacana (sudah melewati ulang tahun ke-10 dan belum melewati ulang tahun ke-12), Orang Tua bersedia mengisi kuisisioner tentang asupan nutrisi pada anak, gigi anterior permanen sudah erupsi Kriteria eksklusi adalah anak yang tidak kooperatif, anak yang mengalami agenesis dan anak yang mengalami persistensi.

Variabel Penelitian yaitu variabel bebas pada penelitian ini status gizi pada anak. Variabel terikat adalah *crowding* anterior dan variabel pengganggu adalah jenis kelamin dan faktor penyebab *crowding* lain selain nutrisi (genetik, *supernumerary teeth*). Alat yang digunakan antara lain kertas kuesioner, alat tulis, alat dasar (sonde, kaca mulut, ekskavator, dan pinset), masker, *handsoen*, senter, kotak steril, *height and weight scales*, kalkulator, *check retractor*, dan kamera. Bahan yang digunakan antara lain air untuk berkumur dan membersihkan alat, alkohol, dan *tissue*.

Langkah kerja penelitian yaitu pertama mengurus perijinan penelitian ke sekolah SD Mulia Wacana Bandung, lalu mengurus persetujuan dari komisi etik penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Rumah Sakit Immanuel, mempersiapkan kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian dengan dilakukan uji validitas dan realibilitas. Mengatur jadwal dilaksanakannya survei untuk pemeriksaan rongga mulut, mempersiapkan alat yang akan digunakan pada saat penelitian, memberikan informasi tertulis mengenai prosedur penelitian kepada orang tua dan guru lalu meminta persetujuan orang tua untuk kesediaan putra putrinya untuk menjalani prosedur penelitian dengan diminta untuk menandatangani *informed consent*.

Langkah kedua, menghitung berat badan dan tinggi badan anak dengan *height and weight scale*, mengkalkulasi pengukuran status gizi berdasarkan Index Massa Tubuh/Umur (IMT/U) menggunakan tabel WHO, kemudian dilakukan pemeriksaan rongga mulut dengan menggunakan *check retractor* lalu dilakukan pengambilan gambar pada bagian gigi anterior rahang atas dan rahang bawah, lalu melakukan pengolahan dan perhitungan data yang telah didapatkan pada saat penelitian. Data hasil kuisisioner dan hasil pemeriksaan yang diperoleh akan diolah menggunakan perangkat lunak komputer SPSS. Analisis data yang digunakan menggunakan korelasi *Chi Square* namun apabila nilai harapan dari sel pada tabel ada yang <5 maka menggunakan *Fisher Exact Test* yang merupakan korelasi antara Index Massa Tubuh / Umur (IMT/U) dan *crowding* anterior

HASIL

Penelitian dilakukan pada 74 subjek penelitian yang berusia 10-12 tahun di Sekolah Dasar Mulia Wacana Bandung. Berdasarkan kriteria inklusi yang ditetapkan terdapat 57 anak yang masuk dalam kriteria penelitian yaitu anak yang berusia 10 hingga 12 tahun dan gigi permanen anterior telah erupsi pada SD Mulia Wacana Bandung, kemudian dilakukan penghitungan berat badan, tinggi badan, dan dilakukan observasi terhadap gigi anterior rahang atas dan bawah pada anak. Tabel 1 menunjukkan berat badan, tinggi badan, index massa tubuh, dan umur pada 57 sampel.

Tabel 1 Berat Badan, Tinggi Badan, dan IMT

	N	Min	Max	Std.	
		Mean		Deviation	
Berat Badan	57	21	62	35,3947	9,90794
Tinggi Badan (cm)	57	122,5	161	141,781	8,53565
Index Massa tubuh	57	11,9	27	17,2905	3,53146
Umur	57	10	12	10,6316	0,67166
Valid N (listwise)	57				

Tabel di atas menggambarkan data responden berdasarkan kategori Umur. Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 29 (51%) responden memiliki jenis kelamin laki-laki dan 28 (49%) responden memiliki jenis kelamin perempuan.

Tabel 2. Jenis kelamin, umur, status gizi, crowding anterior

	F	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	29	51
Perempuan	28	49
Umur (Tahun)		
10	27	47,4
11	24	42,1
12	6	10,5
Total	57	100
Status gizi		
Obesitas	8	14
Overweight	7	12,3
Normal	21	36,8
Kurus	21	36,8
Total	57	100
Crowding anterior		
Ya	32	56,1
Tidak	25	43,9
Total	57	100

Tabel 3. Hubungan status gizi dengan crowding anterior

Status Gizi	Crowding anterior		Kota	X ² hit = 6,065
	Ya	Tidak		
Obesitas	f 5	3	8	df=3
	% 8,8%	5,3%	14,0%	
Overweight	f 1	6	7	X ² Tab = 7,815
	% 1,8%	10,5%	12,3%	
Normal	f 12	9	21	Sig = 0,108
	% 21,1%	15,8%	36,8%	
Kurus	f 14	7	21	
	% 24,6%	12,3%	36,8%	
Total	f 32	25	57	
	% 56,1%	43,9%	100,0%	

Untuk melihat hubungan antara status gizi dengan Crowding Anterior, digunakan analisis chi-square dengan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis: Ho: Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan Crowding Anterior; H1: Terdapat hubungan antara status gizi dengan Crowding Anterior. Berdasarkan hasil perhitungan statistik tersebut diperoleh nilai x^2 hitung sebesar (6,065). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa x^2 hitung (6,065) < x^2 tabel (7,815). Oleh karena itu Ho diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan status gizi dengan Crowding Anterior.

Tabel 3. Frekuensi anak mengkonsumsi makanan, anak membawa bekal, anak memakan daging ayam, daging sapi, dan ikan, anak makan disertai buah dan sayuran, jenis makanan selingan yang dimakan oleh anak, frekuensi anak makan makanan selingan, frekuensi anak minum susu, frekuensi anak minum minuman kemasan, kisaran uang jajan yang dibawa anak, jenis jajanan anak

Pertanyaan	Jumlah anak	%
Frekuensi anak mengkonsumsi makanan		
Kuesioner 1	2X sehari	10 17,5
	3X sehari	47 82,5
Frekuensi anak membawa bekal		
Kuesioner 2	Tidak	1 1,8
	Kadang-kadang	14 24,6
	Ya	42 73,7
Frekuensi anak memakan daging ayam, daging sapi, dan ikan		
Kuesioner 3	Tidak	2 3,5
	Kadang-kadang	31 54,4
	Ya	24 42,1
Frekuensi anak makan disertai buah dan sayuran		
Kuesioner 4	Tidak	1 1,8
	Kadang-kadang	40 70,2
	Ya	16 28,1
Jenis makanan selingan yang dimakan oleh anak		
Kuesioner 5	Permen/coklat	3 5,3
	Biscuit/kue/roti	47 82,5
	Buah	7 12,3
Frekuensi anak makan makanan selingan		
Kuesioner 6	>3X sehar	7 12,3
	3X sehar	7 12,3
	2X sehar	43 75,4
Frekuensi anak minum susu		
Kuesioner 7	Tidak	8 14
	Kadang-kadang	23 40,4
	Ya	26 45,6
Frekuensi anak minum minuman kemasan		
Kuesioner 8	Setiap hari	2 3,5
	2- 3X seminggu	6 10,5
	3	49 86
Kisaran uang jajan yang dibawa anak		
Kuesioner 9	> 4000	18 31,6
	3000-4000	19 33,3
	Tidak bawa uang jajan	20 35,1
Jenis jajanan anak		
Kuesioner 10	Jenis makanan ringan	12 21,1
	Biskuit/kue/roti	22 38,6
	Selalu membawa bekal dari rumah	23 40,4
	Total	57 100

PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Tabel 4 memperlihatkan tingkat prevalensi yang tinggi dari status gizi yang rendah hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Sarah Salim di Jakarta dan Suharyanto di Blora pada anak Sekolah dasar 37% dan 38,6% anak yang status gizi rendah. Didapatkan juga dari penelitian ini prevalensi *crowding* anterior yang tinggi pada Tabel 5 pada seluruh tingkatan status gizi baik yang tinggi atau rendah. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brito D.I di Brazil pada anak 9-12 tahun prevalensi besar pada *crowding* (45,5%).

Hasil penelitian status gizi dengan *crowding* anterior pada Tabel 3, menunjukkan hasil $p > 0,05$ bahwa tidak terdapat hubungan tingkat status gizi dengan terjadinya *crowding* anterior pada anak usia 10-12 tahun. Hal ini menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan dari setiap tingkat status gizi memiliki prevalensi *crowding* anterior yang tinggi. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Thomaz dkk.¹⁰ Pada tahun 2010 yang diteliti pada anak berusia 12-15 tahun di Brazil diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara gizi buruk dengan kasus gigi berjejal.

Hasil tersebut di atas diperkirakan disebabkan karena *crowding* memiliki etiologi yang multifaktorial, yang tidak hanya disebabkan karena status gizi yang rendah dari pengaruh asupan nutrisinya saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Salah satu faktor genetik yang mempengaruhi terjadinya *crowding* adalah panjang lengkung rahang dan ukuran gigi, harus terdapat keharmonisan antara lengkung rahang dengan ukuran gigi.

Penelitian yang dilakukan Hamid M Waheed¹⁸ dimana orang yang mengalami *crowding* memiliki panjang rahang yang lebih pendek dan ukuran mesiodistal gigi yang lebih lebar. Kebiasaan buruk juga dapat mengakibatkan *crowding* seperti menghisap jempol dan *mouth breathing*. Maloklusi yang terjadi dipengaruhi dari durasi, frekuensi dan seberapa besar tekanan kebiasaan buruk tersebut dilakukan.¹⁹ Peneliti Nidhi Pruthi²⁰ menyatakan bahwa *oral habit* mengakibatkan 52.7 % maloklusi termasuk *crowding* anterior. Kemudian *supernumerary teeth* berakibat pada terjadinya *crowding* menurut Iswari H¹⁹ *supernumerary teeth* dapat mengakibatkan rotasi, perubahan posisi gigi, dan maloklusi.

Asupan nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada Tabel 8 terdapat

54,4% anak yang hanya kadang-kadang saja mengonsumsi daging ayam, daging sapi, dan ikan. Tabel 9 menunjukkan 70,2% anak hanya kadang-kadang mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian Tabel 12 memperlihatkan 40,5% anak hanya kadang-kadang saja meminum susu. Kemudian anak juga lebih memilih makanan selingan berupa biskuit atau roti dibandingkan buah-buahan yang terlihat pada Tabel 3 dan anak sering meminum minuman kemasan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Maka dari itu kebiasaan anak membawa bekal dari rumah dilihat dari Tabel 7 cukup dan seimbang.

Nutrisi yang seimbang perlu dilakukan *dietary counseling* berupa konsumsi daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu yang mengandung banyak vitamin, protein, dan mineral yang sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut USDA (*The US Department of Agriculture*) menyarankan untuk mengonsumsi sayuran sebanyak 2,5 cup (275 gram) perhari, buah-buahan 1,5 cup (165 gram) perhari, susu 750 ml perhari, daging 150 gram perhari dan makanan utama sebanyak 3 kali sehari.

Hal tersebut dapat diinformasikan dengan dilakukan penyuluhan pada anak, guru dan orang tua murid pada Sekolah Dasar Mulia Wacana Bandung, sehingga menjadi sadar akan pentingnya nutrisi yang cukup dan seimbang yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Secara khusus nutrisi juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan struktur oral salah satunya pertumbuhan rahang yang dapat mempengaruhi terjadinya *crowding*. Kelemahan dalam penelitian ini adalah pengukuran dari *crowding* anterior tidak diukur berdasarkan tingkatan mild, moderate, dan severe dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya *crowding* seperti genetik dan *supernumerary teeth*.

SIMPULAN

Tidak terdapat hubungan antara Index Massa Tubuh/Umur (IMT/U) dengan *crowding* anterior pada anak usia 10-12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Siti F, Dina PP, Natalia LD. Hubungan ketahanan tingkat keluarga dan tingkat kecukupan

- zat gizi dengan status gizi batita di Desa Gondangwinangun Tahun 2011. *J Kes Masy* 2013;2(2):19.
2. Cataldo CB, DeBruyne LK, Whitney EN. *Nutrition and diet therapy*. Wadsworth/Thomson Learning 2003.
 3. Hidayatullah, Adhani R, Triawanti. Hubungan tingkat keparahan karies dengan status gizi kurang dan gizi baik tinjauan pada anak balita Di Tk Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. *Dentinojournal Kedokteran Gigi* 2016;1(1):104-7.
 4. World Health Organisation (WHO). *World Health Statistics*. Switzerland: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. BMI for age (5-19 years). 2018.
 5. Ringkasan Kajian. *Gizi Ibu & Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, Oktober 2012. h. 1-6.
 6. Oktasafitri D. Hubungan status gizi dengan gigi berjejal pada murid SMP Sutomo 2 Medan. Skripsi. Fakultas Kedokteran Gigi USUS 2014.
 7. Senjaya AA. Kebiasaan buruk yang dapat merubah bentuk wajah. *J Skel Hus* 2012 April;9(1):22-7.
 8. Al-Balkhi KM, Al-Zahrani A. The pattern of malocclusions in Saudi Arabian. patients attending for orthodontic treatment at the college of dentistry, King Saud. University, Riyadh. *Saudi Dent J* 1994; 6 (3): 138-44
 9. Nur Avia Feroza, Fajar Kusuma Dwi Kurniawan, Diana Wibowo. Hubungan antara kebiasaan buruk bernafas melalui mulut dan tingkat keparahan maloklusi di smpn 4 banjar baru dan SMAN 4 banjarbaru.
 10. Thomaz EBAF, Valenca AMG. Relationship between childhood underweight and dental crowding in deciduous teething. *J Pediatría*, 2009;85(2). DOI:10.1590/S0021-75572009000200005.
 11. Staufer K, Landmesser H. Effects of crowding in the lower anterior segment-A risk evaluation depending upon the degree of crowding. *J Orofac Orthop*. 2004 Jan;65(1):13-25.
 12. Isaac chour, Massler M. The development of the human dentition. *J Am Dent Assoc* 1941;28:1153-60.
 13. Brito DI, Dias PF, Gleiser R. Prevalence of malocclusion in children aged 9 to 12 Years Old in the City of Nova. Friburgo, Rio de Janeiro State, Brazil. *R Dent Press Ortodon Ortop Facial* 2009;6(14):118-24.
 14. Susilowati. Prevalensi maloklusi gigi anterior pada siswa Sekolah Dasar. *Makassa Dent J* 2016;5(3):97-101.
 15. Tooth Eruption: The Primary teeth. *J Am Dent Associat (JADA)* 2005;(136):1619.
 16. Pudjiadi S. *Ilmu gizi klinis pada Anak*. 4th ed. Jakarta: Universitas Indonesia. 2003.
 17. Swarjana IK. *Metodologi penelitian kesehatan*. Yogyakarta:CV Andi Offset; 2015.
 18. Waheed M. Dental crowding and its relationship to tooth size and arch dimension. *Pakistan Oral & Dent Jr*. 2005;25(1) June: 47-52.
 19. S Iswari Herlianti. Gigi Supernumerary dan Perawatan Ortodonsi. *E Journal Widya Kesehatan dan Lingkungan Mei-Agustus* 2013;1(1):37-45.
 20. Pruthi N, Sogi MG, Fotedar S. Malocclusion and deleterious oral habits in a north indian adolescent population: A correlational study. *Eur J Gen Dent* 2013;2:257-63.